

ISTRUZIONI PER PAZIENTI

CODICE: IOP.CPOsan59

REV 4

del 17/11/2010

Pagina 1 di 2

UREA ¹³C BREATH TEST
per l'individuazione della presenza di *Helicobacter pylori* nella mucosa gastrica
NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

ORARIO DI ACCESSO

Il test inizia alle ore 8 circa, dal lunedì al venerdì, durata 30 minuti

ESECUZIONE DELLA PROVA FUNZIONALE

Il paziente non deve assumere nelle tre settimane precedenti alcun antibiotico e nell'ultima settimana alcun farmaco gastroprotettore (vedi lista allegata). Deve essere digiuno. Durante la prova immette in appositi flaconcini l'aria espirata in due tempi successivi.

A - Campionamento dell'aria espirata basale (prima dell'assunzione dell'Urea)

1. Il paziente inspira profondamente aria;
2. il paziente, tramite una cannuccia per bibite, soffia nel primo flaconcino, espirando completamente l'aria contenuta nei suoi polmoni;
3. il paziente consegna immediatamente il flaconcino all'operatore, che provvede subito a tapparlo;
4. il paziente ripete la procedura con un secondo flaconcino.

B - Il paziente beve la soluzione al gusto di limone

C - Campionamento dell'aria espirata dopo 30 minuti dall'assunzione dell'Urea

1. Il paziente resta in attesa, seduto, senza fumare, né bere, né mangiare per 30 minuti;
2. trascorsi 30 minuti il paziente inspira profondamente aria;
3. il paziente, tramite una cannuccia per bibite, soffia nel primo flaconcino, espirando completamente l'aria contenuta nei suoi polmoni;
4. il paziente consegna immediatamente il flaconcino all'operatore, che provvede subito a tapparlo;
5. il paziente ripete la procedura con un secondo flaconcino.

NORME DI COMPORTAMENTO

ANTIBIOTICI: L'ASSUNZIONE DEVE ESSERE SOSPESA NELLE TRE SETTIMANE PRECEDENTI

FARMACI GASTROPROTETTORI LA CUI ASSUNZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA UNA SETTIMANA PRIMA DEL TEST:

ANTEPSIN (Sucralfato)	PANTOPAN (Pantoprazolo)
ANTRA (Omeprazolo)	PANTORC (Pantoprazolo)
AXAGON (Esomeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)
BIOMAG (Cimetidina)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)
BRUMETIDINA (Cimetidina)	PEPTIREX (Lansoprazolo)
BUSCOPAN ANTIACIDO (Ranitidina)	PERGASTRID (Lansoprazolo)
CRAFILM (Sucralfato)	RANIBEN (Ranitidina)
CRONIZAT (Nizatidina)	RANIBLOC (Ranitidina)
ERMES (Lansoprazolo)	RANIDIL (Ranitidina)
ESOPRAL (Esomeprazolo)	ROXIT (Roxatidina)
ETIDEME (Cimetidina)	SENSIGARD (Ranitidina)
EUGASTRAN (Lansoprazolo)	SUCRALFIN (Sucralfato)
FAMODIL (Famotidina)	SUCRAMAL (Sucralfato)
FRILANS (Lansoprazolo)	SUCRATE (Sucralfato)
GASTRALGIN (Roxatidina)	SUCRORIL (Sucralfato)
GASTROGEL (Sucralfato)	SURIL (Sucralfato)
LANSOX (Lansoprazolo)	TAGAMET (Cimetidina)
LEVOGENIX (Lansoprazolo)	TEMIC (Cimetidina)
LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCEDIN (Cimetidina)
LOMEVEL (Lansoprazolo)	ULCEX (Ranitidina)
LOSEC (Omeprazolo)	ULCRAST (Sucralfato)
LUCEN (Esomeprazolo)	ULIS (Cimetidina)
MEPRAL (Omeprazolo)	ZANTAC (Ranitidina)
MOTIAX (Famotidina)	ZOTON (Lansoprazolo)
NEOH 2 (Roxatidina)	
NEXIUM (Esomeprazolo)	
NIZAX (Nizatidina)	
OMEPRAZEN (Omeprazolo)	
PANTECTA (Pantoprazolo)	
PANTOLOC (Pantoprazolo)	

Elenco aggiornato dal Dott. Giuseppe Lerro dell'Ospedale Niguarda